SOFIA INITIATIVE
„MINERAL DIVERSITY PRESERVATION”

VIII International Symposium
**MINERAL DIVERSITY
RESEARCH AND PRESERVATION**

СОФИЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА
„СОХРАНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО РАЗНООБРАЗИЯ”

VIII Международнѳый симпозиум
**МИНЕРАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ**

EARTH AND MAN NATIONAL MUSEUM
4, Cherny vruh Blvd., 1421 Sofia, Bulgaria
9 - 11 OCTOBER 2015

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ „ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ”
бул. „Черни връх” 4, София 1421, България
9 - 11 ОКТЯБРЬ 2015

**КОЛЛЕКЦИЯ В.И. СТЕПАНОВА
(МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. А.Е. ФЕРСМАНА РАН, МОСКВА)
КАК ИСТОЧНИК НОВЫХ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ**

ИННА С. ЛЫКОВА^{1,2}, ИГОРЬ В. ПЕКОВ¹, НАДЕЖДА В. ЩИПАЛКИНА¹

¹ *Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,
Геологический факультет; Москва*

² *Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН; Москва*

Резюме. Коллекция В.И. Степанова (1924-1988) является самым крупным частным минералогическим собранием, созданным в СССР. Она дает неоценимый и практически бесконечный материал для исследований. Образец № ST4994 с г. Флора, Ловозеро, Россия, недавно стал голотипом нового минерала кальциомурманита $(\text{Na}, \square)_2\text{Ca}(\text{Ti}, \text{Mg}, \text{Nb})_4[\text{Si}_2\text{O}_7]_2\text{O}_2(\text{OH}, \text{O})_2(\text{H}_2\text{O})_4$ (IMA2014-103; *P*-1; $a = 5.3470$, $b = 7.0774$, $c = 12.146$ Å, $\alpha = 91.827^\circ$, $\beta = 107.527^\circ$, $\gamma = 90.155^\circ$, $V = 438.03$ Å³). Это поздний гидротермальный минерал, образующийся путем изменения (выщелачивания фосфата натрия) раннего высокотемпературного слоистого титаносиликата (ломоносовита $\text{Na}_{10}\text{Ti}_4(\text{Si}_2\text{O}_7)_2(\text{PO}_4)_2\text{O}_4$, и/или беталомоносовита $\text{Na}_6\text{Ti}_4(\text{Si}_2\text{O}_7)_2[\text{H}_3(\text{PO}_4)_2](\text{O}, \text{OH})_4$) совместно с природным ионным обменом с частичной заменой Na на Ca. Псевдоморфоза по 3 x 3 см кубическому кристаллу перовскита с Зеленцовской копи, Южный Урал, Россия (№ ST5895) оказалась одним из лучших образцов гейкилита $(\text{Mg}_{0.76}\text{Fe}_{0.19}\text{Mn}_{0.02})\text{Ti}_{1.02}\text{O}_{3.01}$ в мире. Образцы №№ ST4497, ST4501, ST4502, ST4503 и ST4504 с м-ния Енювче, Восточные Родопы, Болгария, записанные как “бустамит” оказались родонитом необычной морфологии.

Abstract. Collection of V.I. Stepanov (1924-1988) is the largest personal mineralogical collection created in the former USSR. It gives inestimable and practically endless material for studies. Specimen # ST4994 from Mt. Flora, Lovozero, Kola Peninsula, Russia became recently the holotype of a new mineral calcimurmanite $(\text{Na}, \square)_2\text{Ca}(\text{Ti}, \text{Mg}, \text{Nb})_4[\text{Si}_2\text{O}_7]_2\text{O}_2(\text{OH}, \text{O})_2(\text{H}_2\text{O})_4$ (IMA2014-103; *P*-1; $a = 5.3470$, $b = 7.0774$, $c = 12.146$ Å, $\alpha = 91.827^\circ$, $\beta = 107.527^\circ$, $\gamma = 90.155^\circ$, $V = 438.03$ Å³). It is a late-stage hydrothermal mineral, formed as a result of the alteration (sodium phosphate leaching) of an earlier high-temperature layered titanosilicate mineral (lomonosovite $\text{Na}_{10}\text{Ti}_4(\text{Si}_2\text{O}_7)_2(\text{PO}_4)_2\text{O}_4$ and/or betalomonosovite $\text{Na}_6\text{Ti}_4(\text{Si}_2\text{O}_7)_2[\text{H}_3(\text{PO}_4)_2](\text{O}, \text{OH})_4$) coupled with natural cation exchange resulting in the partial replacement of Na for Ca. Pseudomorph after 3 x 3 cm cubic perovskite crystal from the Zelentsovskaya Pit, Southern Urals, Russia (# ST5895), turned out to be one of the world-best specimens of geikielite $(\text{Mg}_{0.76}\text{Fe}_{0.19}\text{Mn}_{0.02})\text{Ti}_{1.02}\text{O}_{3.01}$. Specimens ## ST4497, ST4501, ST4503, ST4503 and ST4504 from Eniovche Mine, Rhodopes, Bulgaria, labeled as “bustamite”, found out to be rhodonite unusual in morphology.

Коллекция выдающегося минералога Виктора Ивановича Степанова (1924-1988), переданная им в конце жизни в Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана РАН в Москве и ныне там хранящаяся, является самым крупным частным минералогическим собранием, созданным в СССР. Две временные выставки, демонстрирующие основные аспекты коллекции были организованы в музее в 2014-2015 годах. Они посвящены 90-летию со дня рождения В.И. Степанов, так же, как и специальная статья, опубликованная в Минералогическом Альманахе (Пеков и др., 2015). Коллекция, охватывающая большую часть 20-го века, дает неоценимый и практически бесконечный материал для исследований. Образцы активно используются в научно-исследовательских проектах, в том числе, в рамках студенческих и аспирантских работ. Здесь приведены некоторые результаты.

Образец **ST4994** с г. Флора, Ловозерский щелочной массив, Кольский п-ов, Россия, обозначенный как «беталомоносовит», недавно стал голотипом нового минерала **кальциомурманита** $(\text{Na}, \square)_2\text{Ca}(\text{Ti}, \text{Mg}, \text{Nb})_4[\text{Si}_2\text{O}_7]_2\text{O}_2(\text{OH}, \text{O})_2(\text{H}_2\text{O})_4$ (IMA2014-103; *P*-1; $a = 5.3470(6)$ Å, $b = 7.0774(7)$ Å, $c = 12.1456(13)$ Å, $\alpha = 91.827(4)^\circ$, $\beta = 107.527(4)^\circ$, $\gamma = 90.155(4)^\circ$, $V = 438.03(8)$ Å³). Этот образец был подарен В.И. Степанову в 1980 г А.П. Хомяковым

Кальциомурманит образует бежевые пластинчатые кристаллы размером до 0.1 x 0.4 x 0.6 см, собранные в агрегаты размером до 3 см в мелкокристаллической породе, сложенной преимущественно эгирином, микроклином и натролитом с подчиненными лоренценитом, фторapatитом, кальцитом (рис. 1). Это поздний гидротермальный Na-Ca-упорядоченный слоистый титаносиликат группы эпистолита, принадлежащей полисоматической серии бафертисита (Ferraris, Gula, 2005).

Кальциомурманит рассматривается нами как *трансформационный минеральный вид* [термин предложен А.П. Хомяковым (1990)], т.е. минерал, не способный кристаллизоваться напрямую из расплава или раствора, а образующийся лишь путем замещения раннего высокотемпературного P-содержащего титаносиликата (ломоносовита $\text{Na}_{10}\text{Ti}_4(\text{Si}_2\text{O}_7)_2(\text{PO}_4)_2\text{O}_4$, и/или беталомоносовита $\text{Na}_6\text{Ti}_4(\text{Si}_2\text{O}_7)_2[\text{H}_3(\text{PO}_4)_2](\text{O}, \text{OH})_4$) при участии обогащенного Ca^{2+}

гидротермального раствора. Мурманит $\text{Na}_4\text{Ti}_4(\text{Si}_2\text{O}_7)_2\text{O}_4(\text{H}_2\text{O})_4$ рассматривается как промежуточная стадия в эволюционной серии ломоносвит-кальциомурманит. Трансформация ломоносвита в мурманит осуществляется путем выщелачивания фосфата натрия, а мурманита в кальциомурманит – природного ионного обмена с частичной заменой Na^+ на Ca^{2+} .

Это подтверждается:

1. Многочисленными микровключениями фторапатита, рассеянного в пластинках кальциомурманита;
2. Присутствием небольшого количества Р (до 1.8 мас.% P_2O_5) в кальциомурманите;
3. Наличием реликтов беталомоносвита в образце из карьера Коашва, Хибин, Россия;
4. Экспериментально доказанной способностью мурманита к ионному обмену с Са (Лыкова, 2015).

Рис. 1. Кальциомурманит (ММФ № ST4994) с г. Флора, Ловозерский щелочной массив, Кольский п-ов, Россия: а) бежевые пластинчатые кристаллы размером до 0.6 см в мелкокристаллической породе. Размер образца 4 x 6 см; б) пластины кальциомурманита с микроклином, эгирином и фторапатитом. РЭМ-фото (BSE).

Псевдоморфоза по 3 x 3 см кубическому кристаллу перовскита с Зеленцовской копи, Златоуст, Южный Урал, Россия, обозначенная как «кричтонит?» (**ST5895**) оказалась гейкилитом ($\text{Mg}_{0.76}\text{Fe}_{0.19}\text{Mn}_{0.02}\text{Ti}_{1.02}\text{O}_{3.01}$) (рис. 2). Электронно-зондовый анализ получен на электронном микроскопе CamScan MV2300 с энергодисперсионным анализатором INCA Energy-350 (Институт экспериментальной минералогии РАН, г. Черноголовка; аналитик Д.А. Варламов). Без сомнения данный образец является одним из лучших образцов гейкилита в мире.

Рис. 2. Псевдоморфоза гейкилита по 3 x 3 см кубическому кристаллу перовскита; Зеленцовская копь, Южный Урал, Россия. ММФ № ST5895. Фото: М.Б. Лейбов

Образцы *ST4497*, *ST4501*, *ST4502*, *ST4503* и *ST4504* с м-ния Енювче, Восточные Родопы, Болгария, записанные как “бустамит” оказались родонитом необычной морфологии. Игольчатые до волокнистых кристаллы серо-розового родонита образуют сферолитовые корки и радиально-лучистые агрегаты.

Электронно-зондовые анализы родонита получены на электронном микроскопе Jeol 6480lv с энергодисперсионным анализатором INCA Energy-350 (лаборатория локальных методов исследования вещества кафедры петрологии Геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва; аналитик Н.Н. Кошлякова). Эмпирические формулы, рассчитанные на 10 катионов, приведены ниже.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №. 14-17-00048 (в части минералогического исследования кальциомурманита). Отдельная благодарность С.В. Федющенко за поддержку данной работы.

ЛИТЕРАТУРА

Лыкова И.С. Минералы группы эпистолита: посткристаллизационные преобразования и их кристаллохимические механизмы (природные системы и модельные эксперименты). Дисс. к.г.-м.н. М., МГУ, 235 с.

Пеков И.В., Лыкова И.С., Никифоров А.Б. Коллекция Виктора Ивановича Степанова и ее значение // Минералогический альманах, 2015, 20(2), с. 12-45.

Хомяков А.П. Минералогия ультраагпаитовых щелочных пород. М: Наука, 1990, 200 с.

Ferraris G., Gula A. Polysomatic aspects of microporous minerals - Heterophyllosilicates, palysepioles and rhodesite-related structures // Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 2005, 57, p. 69-104.